

## 常用的现场止血方法有哪些方法？

常用的现场止血方法有指压法、加压包扎法、填塞法和止血带法。出血部位的不同，出血的性质不同，危险性不同，止血方法也有所区别。原则上应根据出血部位及现场的具体条件选择最佳方法，使用急救包、消毒敷料、绷带等，在紧急情况下，现场任何清洁而合适的物品都可临时借用做止血用物，如手帕、毛巾、布条等。

## 现场有哪些止血方法？

现场可采用以下止血方法：

(1)一般止血法。针对小的创口出血，需用生理盐水冲洗消毒患部，然后覆盖多层消毒纱布用绷带扎紧包扎。如果患部有较多毛发，在处理时应剪、剃去毛发。(2)指压止血法。只适用于头面颈部及四肢的动脉出血急救，注意压迫时间不能过长。(3)屈肢加垫止血法。当前臂或小腿出血时，可在肘窝、膝窝内放纱布垫、棉花团或毛巾、衣服等物品，屈曲关节，用三角巾作8字形固定。但骨折或关节脱位者不能使用。(4)橡皮止血带止血。常用的止血带是三尺左右长的橡皮管。(5)绞紧止血法。把三角巾折成带形，打一个活结，取一根小棒穿在带子外侧绞紧，将绞紧后的小棒插在活结圈内固定。(6)填塞止血法。将消毒的纱布、棉垫、急救包填塞、压迫在创口内，外用绷带、三角巾包扎，松紧度以达到止血为宜。