伊维菌素注意哪些？

伊维菌素虽较安全，除内服外，仅限于皮下往射，因
肌肉、静脉注射易引起中毒反应。每个皮下注射点，亦不宜超过10
毫升。含甘油缩甲醛和丙二醇的国产伊维菌素注射剂，仅适用于
牛、羊、猪和驯鹿，用于其他动物，特别是犬和马时易引起严重局部
反应。多数品种犬应用伊维菌素均较安全，但有一种长毛牧羊犬
对本品敏感，100微克/千克以上剂量即出现严重不良反应。但60
微克/千克量，一月一次，连用一年，对预防心丝虫病仍安全有效。
伊维菌素对线虫，尤其是节肢动物产生的驱除作用缓慢，有些虫
种，要数天甚至数周才能出现明显药效。伊维菌素对虾、鱼及水生
生物有剧毒，残存药物的包装品切勿污染水源。阴雨、潮湿及严寒 天气均影响0.
5%伊维菌素浇泼剂的药效；牛皮肤损害时（蜱、疥
螨)能使毒性增强。伊维菌素注射剂的休药期：牛35天，羊42天，
产奶期禁用;猪18天;驯鹿56天;食用马禁用。预混剂休药期，猪 5天。

伊维菌素药物相互作用有哪些？

伊维菌素商品制剂中含有的不同佐剂能影
响药物的作用，如绵羊内服含吐温-80做佐剂的制剂，伊维菌素用 量达4
000微克/千克时，仍很安全，但若以丙二醇作佐剂时则使绵
羊持续3天出现共济失调和血红蛋白尿。美国含吐温-80做佐剂
的伊维菌素注射剂是马属动物专用商品制剂.但不能用于犬，否则 也极不安全。