

## 小奶牛-小奶牛多长时间可以配种？小奶牛多长时间可以配种

??24天出现一次发情现象，发情周期平均为21天，发情持续期为1至2天，平均为18小时。母牛发情表现兴奋不安、时常鸣叫、食欲减退、母牛间相互爬跨、阴门肿胀、流粘液，出现性行为现象。一般情况下一头奶牛在下崽后开始产奶，到第二次下崽前两个月停奶。希望我的回答对亲有帮助，如果满意还请亲给我个好评（好评对我非常重要），非常感谢～。

## 小苏打粉和奶牛混合有什么作用？

饲养奶牛添加小苏打好处多

### 1、小苏打的用法：

用量：50—70克/头/日，犍牛及后备牛酌减。

用法：根据每日饲喂奶牛精料的次数，将小苏打分若干次直接拌于精料中饲喂。

### 2、讨论与小结：

（1）呈碱性的小苏打中和了奶牛瘤胃内的酸性物质，减少了奶牛瘤胃酸中毒的危险，增强了奶牛对疫病的抵抗力，发病率明显下降。

（2）进入奶牛瘤胃内的小苏打增强了瘤胃弱碱性环境，有利于增强瘤胃内有益菌的活性，促进牛瘤胃的蠕动，提高奶牛的采食量。

（3）在奶牛的饲料中添加一定量的小苏打，促进了乳脂的合成，提高了奶牛的乳脂率。

（4）在奶牛的饲料中添加一定量的小苏打，泌乳奶牛的产奶量有所增加。

（5）兽医在奶牛的治疗上，往往采用静脉注射5%的碳酸氢钠1000——1500毫升，收效明显。